

四庫全書

子部

# 欽定四庫全書

子部

普濟方卷一百九十五

詳校官太醫院醫士臣程泰

編修臣倉聖脈覆勘

總校官庶吉士臣何思鈞

校對官中書臣石鴻緒

謄錄監生臣方汝觀

欽定四庫全書

普濟方卷一百九十四 明

周王朱橚 撰

水病門

水腫胸滿氣急

附論

內經論水病謂其本在腎其末在肺又曰肺為喘呼腎為水腫氣否滿塞於胸中故有胸中滿急之證蓋由腎虛既成聚水之病上攻於肺布葉舉在於胸背者胸中之附也

防己丸 治水氣腫滿肺氣喘急咳嗽脹滿悶坐臥不得喉中作聲心胸痞滯

防己 白朮 五味子 紫苑

去苗土 各半兩

馬兜鈴

桑根白皮

去皮

陳橘皮

浸焙去白 各一兩

甘草

炙剉 一分

杏仁

五十枚浸炒 去皮尖雙仁

右搗羅為末煉蜜和丸梧子大每服十五丸至二十丸溫生薑湯下不拘時候

澤瀉丸 治水氣腿股腫滿喘促咳嗽坐臥不得

澤瀉

芫花

炒

郁李仁

炒去皮尖

牽牛子

炒去頭末

防己

苦葶藶

炒各一錢

滑石

研

大戟

炒各三分剉

海蛤

研

甘遂

炒

檳榔

剉各半兩

右搗羅為末煉蜜和丸梧桐子大每服二十九食前

煎陳皮湯送下

茯苓杏仁煎

療氣忽發滿胸急者

茯苓

四兩

杏仁

四兩製去皮尖

橘皮

三兩

右切以水九升先煮諸藥取三升去滓內竹瀝生薑

汁蜜等和攪微火煎取四升一服四合日再夜一忌  
海藻松菜酢物

十聖九 治水病喘氣上氣消腫脹

大戟

炒

桑白皮

切炒

甘遂

炒

甜葶藶

紙上炒

巴豆

去皮心炒  
各半兩

續隨子

去皮

檳榔

剉

烏頭

去皮

臍細慢火炒令焦黑  
烟出為度各一分

杏仁

去皮心雙  
仁炒三分

牽牛子

炒二兩  
三分

右為末蜜丸如雞頭大每服一九生薑湯化下更量

病勢加減

療氣忽發滿腹急者方

猪腎

一具生  
破去膜

桑根白皮

五兩

茯苓

四兩

澤漆葉

三兩

防己

三兩

澤瀉

三兩

橘皮

三兩

大豆

三升  
淨

郁李仁

一升  
碎

甘遂

三兩  
煮

右切以水一斗三升先煮猪腎桑根白皮澤漆葉大豆取八升去滓內餘藥煎取二升七合分為三服忌

醋物

甘遂湯

出聖惠方

治水腫胸滿氣急上喘大小便澀

甘遂

炒一兩半

赤茯苓

去皮

郁李仁

浸去皮尖研

黃芩

去心

杏仁

去皮尖雙仁炒各二兩

澤瀉

陳橘皮

浸去白炒乾

澤漆

微炒各二兩

右搗篩每服五錢水三盞煎至一盞半去滓分溫三服一方煎桑根白皮湯調下末一錢以利為効

療氣忽發心滿胸急者

桑白皮

四兩

橘皮

三兩

茯苓

四兩

杏仁

三兩

甘遂



澤瀉

三兩

黃芩

四兩

赤小豆

一升

右切以水九升煮取二升半分三服忌酢物一方甘

草三兩

又方

青羊腎

一具

桑根白皮

四兩

茯苓

四兩

橘皮

三兩

李根白皮

四兩

黃耆

三兩

玄參

三兩

生薑

四兩

右切以水九升煮取二升七合分三服忌酢物

黃耆丸

出聖濟總錄

治水氣消腫定喘

黃耆

剉

甘遂

炒

青橘皮

浸焙  
去白

麥蘖

大戟

炒

陳橘皮

浸去  
白焙

陳麴

炒各  
半兩

右為末煉蜜九桐子大煎木通桑根白皮湯下

苦葶藶丸

出聖濟  
總錄

治水氣喘滿小便赤澁腰腿浮腫

不得眠臥

苦葶藶

四兩三分  
紙上炒

杏仁

三分浸去  
皮尖炒

右搗羅五味為末與二味研者和勻煉蜜九桐子大  
每服二十九食後煎橘皮湯下日再煎紫蘇湯下亦

可

郁李仁湯

出聖惠方

治水腫胸滿氣急

郁李仁

浸去皮尖炒

桑根白皮

炙

赤小豆

炒各三兩

紫蘇

一兩半

橘皮

二兩

茅根

切四兩

右搗篩每服五錢水三盞煎至一盞去滓溫服

葶藶散

出危氏方

治因飲水漿多感冷濕胸腹脹滿瀝咯

有聲喘急氣促面色黃

芫花

炒赤

甘遂

大戟

黑牽牛

炒取為末

右各等分為末每服一錢先將紅棗十枚煎湯一盞  
調溫再單飲棗湯送下平旦服病不除明日更服加  
半錢利後稀粥自養但服加味控涎丸方見喘急

茯苓湯 治水腫胸中氣滿喘急

赤茯苓

去皮

杏仁

去皮尖雙仁  
炒各四兩

陳橘皮

浸去白  
炒二兩

右搗篩每服五錢水三盞煎至一盞去滓溫服日再  
服隨小便下

療氣忽發滿胸急者

大棗

三十枚  
打破

右以水四升煮取二升內蜜和調不得過甜不過酸  
稍含咽之

水腫欬逆上氣

附論

內經謂腎為水腫肺為喘呼氣逆不得臥蓋腎主水肺主  
氣虛不能制水水氣脹滿上乘於肺肺得水而浮故上  
氣而欬嗽古方有曰腫從水起上氣而欬名曰白水其病  
在肺

烏腎丸

出聖惠方

治水氣腫滿欬逆上氣

烏腎

半兩

蛤蚧

一對塗酥微炒

木通

半兩

漢防已

半兩

檳榔

半兩

大戟

三分

陳橘皮

三分

海藻

半兩炒洗去鹹

木香

半兩

當歸

半兩剉碎微炒

郁李仁

三分湯浸去皮尖微炒

續隨子

一分

海蛤

半兩細研

肉桂

半兩去皺皮

赤茯苓

半兩

赤芍藥

半兩

右為末煉蜜和丸如小豆大每日五更初以桑根白

皮湯下三十九

大白前湯

出聖濟  
總錄

治水欬逆上氣通身洪腫短氣脹

滿晝夜臥不得喉中鳴大小便不通不下食而不甚

渴

白前

一兩半

紫苑

去土  
二兩

半夏

湯洗七遍去滑  
焙乾二兩剉

生澤漆根

微炒  
一兩

右四味搗篩每服五錢水一盞半煎至一盞去滓入

內後藥

桂

去皮一  
兩半

人參

三分

白朮

赤茯苓

去皮各  
二兩

葶藶散

治十種水氣喘急坐臥不得小便淋瀝

方見十類

神助散

褚證漢防己散

出千金方

治水腫上氣

漢防己

澤漆葉

石葦

澤瀉

各五兩

白朮

桑根白皮

丹參

赤茯苓

橘皮

通草

各三兩

郁李仁

五合

右治下篩為粗散以水一升煮三因方取八合去滓

頓服一日三取小便利為度



大棗散

出聖濟  
總錄

治遍身浮腫脹上氣不得臥大小便

澁先服大棗散後服海蛤丸後三年不得食肉入房  
不爾病必重發治陽中風下利嘔逆短氣不惡寒熱  
汗出發作有時頭痛心痞硬引脇下痛兼下水腫腹  
肋脹并酒食積腸垢積滯疰癰腎積畜熱極痛塵氣  
久不已或表之正氣與邪熱并邪熱并甚於裡熱極  
以陰及寒表氣入裡陽氣極深脉將絕并風熱燥甚  
結於下焦大小便不通實熱腰痛

芫花

分 炒一

甘遂

分 炙半

大戟

分 去皮

右搗羅為散每服一錢以大棗十枚水一盞半煮棗  
二十沸去滓棗調藥空心頓服當利勿止勿止三服  
後服海蛤丸人實更加服隨實虛加減

海蛤丸

出聖濟  
總錄

海蛤

別研

赤茯苓

去皮各  
一兩

狼毒

分三

桑根白皮

炙

玄參

微炙各  
一兩

膩粉

半兩

薏苡仁

陳橘皮

浸炒  
去白

防己

葶藶

炒  
研

杏仁

湯浸去皮尖雙  
仁炒各一兩

右除海蛤外搗羅為末同海蛤再研勻煉蜜丸如小豆大每服空心用橘皮湯下三十九日三服五日後覺齒痒即住藥齒腫口瘡即是瘡候

白前湯

出聖濟總錄

治水欬逆上氣通身浮腫短氣脹滿

晝夜倚壁不得卧其喉中水雞聲

白前

十兩三分

紫苑

去土一兩半

半夏

洗七遍三兩

澤漆

根

炒

桔萎

一枚去皮

白朮

一兩

桂

去皮一兩半

人參

乾薑

各半兩

吳茱萸

浸一宿炒二兩

右搗篩每服用五錢水三盞入棗二枚生薑一塊拍

破煎至一盞半去滓分二服當小便利或微溏腫即

減

防己湯

出聖濟總錄

治水氣欬逆上氣四肢浮腫坐臥不

安

防己

半兩

桑根白皮

剉

木通

剉

赤茯苓

去皮各一

兩

澤漆

郁李仁

浸去皮炒

甜葶藶

各半兩隔紙炒紫色

陳橘皮

浸去白焙二兩

右搗篩每服五錢水一盞半棗四枚擘破同煎至七分去滓食後溫服

黃耆湯 治水氣面浮欬嗽氣促

黃耆

分三

柴胡

去苗

赤芍藥

炒

赤茯苓

去皮各半兩

陳橘皮

浸去白焙

麥門冬

去心焙

惡實

炒

甘草

炙各

分三

右搗篩每服三錢水二盞煎至七分去滓溫服不拘

時候

治水氣浮腫欬逆上氣宜服此方

甜葶藶

三分隔紙焙

杏仁

湯浸去皮尖雙仁半兩炒微黃

赤芍藥

半兩

秦艽

半兩去皮

漢防己

半兩

麻黃

半兩

郁李仁

半兩

桑根白皮

半兩

甘草

半兩

右篩為散每服三錢以漿水一盞煎至六分去滓溫

服日三四服

杏仁散

出聖惠方

治水氣腫盛欬逆上氣小便赤澀

杏仁

一兩湯浸去皮尖雙仁炒微黃

茅根

一兩半

赤茯苓

一兩

陳橘皮

一兩湯浸去白

桑根白皮

二兩

郁李仁

二兩湯浸去皮

微炒

澤漆葉

二兩

川芒硝

一兩

木通

一兩

右為散每服四錢水一鍾入生薑半分煎至五分去

滓空心溫服如人行十里當下黃水一二升為効

鯉魚湯

出聖濟總錄

治水腫腹大喘欬胸滿不得臥

鯉魚

一箇重三斤去鱗腸肚

桂皮

紫苑

去苗土各二兩

防己

黃芩

去黑心

硝石

研如粉

人參

各二兩

右除魚搗篩先用東流水五升煮魚令爛熟去魚內

藥末五錢匕煮赤小豆一合大棗三枚擘生薑三片  
候豆熟去滓溫服日三夜一

治水腫欬逆上氣坐臥不得宜服此方

出聖惠方

甜葶藶

一兩陽紙炒令紫色

橘皮

一兩湯浸去白焙

甘遂

半兩炒微

黃

牽牛子

一兩炒微黃

郁李仁

半兩湯浸去皮微炒

右搗羅為末煉蜜和丸梧桐子大每服煮赤小豆飲  
及大麻子飲下七丸日三服以大小便利為度

又方

出聖惠方



海蛤

一兩  
細研

甜葶藶

一兩  
隔紙炒紫色

漢防己

一兩  
剉

杏仁

三分  
湯浸去皮  
尖雙仁炒微黃

甘遂

一兩  
炒令微黃

桑根白皮

一兩  
剉

右搗為末以棗肉和搗三二百杵丸梧子大每服於食前煎以大麻子湯下七丸

白前湯 治水咳逆上氣身體浮腫短氣脹滿晝夜倚壁不得臥咽中作水雞鳴

白前

紫苑

半夏

大戟

各三兩

右咬咀以水一斗浸一宿明旦煮取三升日三服

水腫小便澁

附論

水氣小便澁者由榮衛不調經絡否澁脾腎虛弱使水氣流澁於皮膚四肢腎與膀胱有熱故也凡此二經俱主於水流行於小腸入脾為小便也今熱氣在於臟腑水行則澁故令小便澁

海蛤丸 主下氣水苦小便澁腫氣妨悶食

昆布

洗

橘皮 赤茯苓 漢防己 海蛤

研

郁李仁

桑根白皮

澤漆

檳榔

杏仁

各四

分去皮尖  
雙仁研

大黃

六分

葶藶

二十分微  
炙麩令黃

右搗篩蜜丸梧子大每服十五丸日二服加至二十

五丸以小便利為度忌熱麵冷滑大酢

海蛤丸

出聖濟  
總錄

治水腫腹滿四肢黃瘦喘促小便澀

海蛤

二兩  
研

木香

訶梨勒皮

防己

厚朴

去粗

皮生薑  
汁炙

旋覆花

各一兩

白檳榔

剉

鱉甲

去裙  
爛醋

浸

郁李仁

去皮研各  
一兩半

桂

去皮  
半兩

右為末煉蜜九桐子大每服二十九煎大腹皮湯送

下之

海蛤九

出聖惠方

治大腹水腫四肢洪滿小便澀少

海蛤

一兩研

甜葶藶

一兩隔紙炒令黃色

赤茯苓

一兩去皮

桑根白皮

一兩剉

郁李仁

一兩湯浸微炒

防己

一兩剉

陳橘皮

一兩湯浸去白

甘遂

半兩炒微黃

右搗羅為末別擣葶藶如泥內藥末中和勻煉蜜和

九二三百杵九梧子大每服二十九以粥飲下日三

四服

又方

出聖惠方

檳榔一兩

牽牛子

一兩微炒

赤茯苓

一兩

桑根白皮

一兩判

甜葶藶

一兩隔紙炒黃色

漢防己

半兩

右為末別搗葶藶如泥內藥末中和搗三二百拌丸  
梧子大每服二十九粥飲下日三服以瘥為度

漢防己散

出聖惠方

治水氣四肢腫滿上氣滿喉中喘急

小便秘澀

漢防己

一兩

木通

一兩

桑根白皮

一兩

赤茯苓

一兩

甘草

半兩

大腹皮

半兩

牽牛子

二兩

右搗羅為散每服三錢以水一中盞入生薑半分葱

白七寸煎至六分去滓不計時候溫服

商陸丸

出聖惠方

治水腫利小便消脹滿宜服

商陸

一兩

川芒硝

半兩

甘遂

一分微炒黃

川大黃

半兩

劉碎微炒

芫花

半兩醋拌炒乾

芫花

半兩微炒

右為末煉蜜和搗三二百杵九梧子大每服食前粥

飲下三九以利為度

蘧麥散

出聖惠方

治水氣面目腿膝硬小便赤澀

蘧麥

一兩

滑石

一兩

漢防己

一兩

川大黃

一兩剉微炒

川芒硝

一兩

右為散每服三錢水一中盞煎至六分去滓不計時候溫服

又方

出聖惠方

木通

二兩剉

桔梗

一兩去蘆頭

赤芍藥

一兩

甜葶藶

一兩 桑根白皮 一兩

右為散每服五錢水一大盞煎至五分去滓不計時

候溫服

大戟散

出聖惠方

治水氣腫滿大小便澀壅宜服

大戟

一兩湯浸去白微炒

陳橘皮

一兩湯浸去白

商陸

一兩剉

木通

一兩剉

蘧麥

一兩剉

右為散每服三錢水一盞煎至六分去滓空腹溫服

如未通即良久再服



水銀九

出聖惠方

治水氣腹脹促小便澀

水銀

一兩乳鉢內研令星盡

甜葶藶

一兩用隔紙炒令紫色

椒目

半兩微炒出汗

浮萍草

半兩

滑石

二兩

右為末研入水銀令勻煎皂莢子膠和九梧子大每服十五九葱湯下日三服

香蘇散

出衛生寶鑑

治水氣虛腫小便赤澀

陳皮

一兩去白

防己

木通

紫蘇葉

各半兩

右為散每服二錢水二盞生薑三片同煎六分去滓

溫服食前日二

治水氣小便澁身體虛腫宜服此方

出聖惠方

搗柏皮

一兩

木通

一兩判

檳榔

一兩

右為細末每服二錢粥飲下不計時候

塗臍膏

出得生堂

治水腫小便絕少

地龍

生者炒研

猪苓

針硝

煨紅存性

右各一兩為末搗葱涎研成膏傅臍中約一寸高以闊絹帛縛定出小便多為度日二更入甘遂同為末

尤妙

治水氣小便澀喘息促四肢無力宜服此方

沙牛尿

斗一

訶梨勒皮

半斤  
搗末

右先以牛尿於銅器中煎至二升入訶梨末熟令硬  
軟得所丸如梧子大每服茶酒任下三十九日三服  
當下水及惡物為効

治水氣洪腫澀方

出聖  
惠方

芫花根

一兩  
剉炒

右為末每服空心以溫水調下一錢得小便大利瘡  
治水腫煩渴小便赤澀方

冬瓜白瓤

不限  
多少

右以水煮令熟和淡食之  
治水氣偏身腫小便赤澀方

甜葶藶

二兩 隔紙  
炒令紫色

右搗如膏煮棗肉和丸梧子大三十九煎桑根白皮  
湯下日三四服之

治氣喘促腫浮小便澀

用杏仁一兩去皮尖熬研和米煮粥極熟空心喫二合

千金翼 治小便不利膀胱水氣流滯

用浮萍晒乾為末服方寸匕日一二服良

蠱病 附論

內經謂脾風傳之腎病名曰疝瘕少腹膀胱冤熱而痛  
出白一方名曰蠱夫脾受風邪傳於腎經邪熱內燦其

情不守久而弗治適以喪已志也水之精為志志既喪則情從之左傳謂惑以喪志為蠱者如此

大沉香尊重丸方 治蠱腹滿水腫遍身腫病滿氣逆嘔噦喘急小便赤澁大便不調一切中滿下虛危困病證其効不可盡述

滑石

錢三

沉香

丁香

人參

檳榔

車前子

葶藶

錢各二

青皮

白牽牛

枳實

炒

木通

各四

錢

胡椒

木香

海金沙

蝎尾

去毒

茯苓

肉蓯蓉

各一分

蘿蔔子

六錢炒

白丁香

一錢半別研

郁李仁

湯浸去皮  
一兩二分

右為細末生薑自然汁打糊為丸如豌豆大每服二十丸生薑湯下不拘時候日進三服忌鹽魚菜肉麵食單服米粥常治水蠱用尊重丸為正散腫丸為副日各二服如蠱脹高腹肚有些小青筋腫少脹多者單服此藥一方加陳皮

無價散

治諸般蠱氣

青皮 陳皮 桑白皮炒 豬苓 車前子焙

澤瀉 續隨子 甜葶藶炒 樟柳根 大戟

白牽牛末 甘遂 川椒 木香 木通去皮

郁李仁各等分

右件為末每服三錢用葱白二根切水二盞煎至五分和滓溫服

檳榔散 治男子婦人蠱氣及下元腿膝虛腫

檳榔 白茯苓 白附子 白朮 芫花 蓬朮



大戟 甘遂 黑牽牛 巴戟 青皮 荊三稜

肉桂

茴香

各等分

右為末每服一錢用樟柳根煎湯調服一更前後取  
脚上水二更煎升麻湯下取面上水三更煎赤小豆  
湯下取手上水四更煎桑白皮湯下取肚中水五更  
煎茶酒下取膜中水

治蠱證

茯苓

二兩

茯神

二兩

猪苓

一兩

乾山藥

二兩

人參

白酒麴

半兩

神麴

半兩

麥門冬

半兩

牽牛

半兩  
頭末

乾生薑

二兩

右樟柳根去皮淨咀作片子水浸一宿天明換水煮  
乾爛就搗研晒乾與前藥料對半一同分兩為末生  
薑汁葱頭自然汁打糊為丸梧子大每服三十丸或  
四五十丸不拘時候

搗腫神應丸

男子婦人諸腫蠱毒肚脹如鼓脾癰癥

瘕氣塊上喘氣急咳嗽倚息不得腫服諸藥得自秘

傳用之

三稜

莪朮

青皮

各一兩

乾漆

燒一兩

元花

七錢

半

大戟

一錢

礪砂

一錢

巴豆

去殼取霜  
研一錢

右前藥和一處用好米醋一大碗慢火淬乾為度取出晒乾碾為末醋糊為丸作如梧子大每服四五十丸用生薑湯五更空心下隨用椒目六兩白蘿蔔子半斤炒香熟用手帕盛藥熨患身上俱腫處如冷則再取出炒熟仍熨至再至三直至小大便行後方住

熨如去大便後要住溫稀粥一盞補即止

肉蓯蓉丸 治蠱病小腹寬熱而痛便溺出白

肉蓯蓉

去皮酒浸焙

白茯苓

去皮

黃耆

剉

澤瀉

五味子

龍骨

牡蠣

火煨研

當歸

切焙各一兩

右為末煉蜜丸梧子大每日服三十九丸須溫服酒下  
空心日午臨臥各一服

萬安丸 治蠱病

大黃 雷丸 木香

各一兩

苦葶藶

樟柳根

各半

兩

黑牽牛

白牽牛

各一兩半

檳榔

七箇

右為末每服五錢用熟蜜五錢酒一盞調服空心食前

大建中湯

出宣明論

治蠱病小便腹急脹痛便溺失精洩

而出白液

黃耆

剉

遠志

去心

當歸

去蘆頭

澤瀉

各三兩剉焙

芍藥

炒

人參

龍骨

甘草

各二兩

右剉如麻豆大每服五錢匕水二盞生薑三片棗二

枚劈破煎至一盞去滓溫服不拘時候

澤瀉丸

治蠱病小腹寬熱而痛精氣不守洩便出白

澤瀉

剉

補骨脂

炒

巴戟天

去心

五味子

焙

石斛

去根

芍藥

人參

甘草

右為末煉蜜丸梧子大每服三十九溫酒或鹽湯下

空心日臨臥合服一服

乾地黄丸

治蠱病精氣不守便溺出白小腹寬熱而

痛

熟地黄

焙半兩

鍾乳粉

半兩

龍骨

兔絲子

酒浸一宿

別搗

磁石

火煨醋淬七遍

芍藥

黃芩

去黑心各一兩

右為末酒煮麵糊為丸桐子大每服二十丸溫酒或

鹽湯下空心日晚

無憂散

出儒門事親

治腹肚蠱脹大便不利

木香

半兩

白朮

半兩

桑白皮

陳皮

木通

剉

黃耆

各半兩剉

官桂

半兩一方用胡椒

療氣忽發滿胸急者方

猪腎

一具去脂膜

桑根白皮

五兩

茯苓

四兩

澤漆葉

三兩

防己

三兩

澤瀉

三兩

橘皮

三兩

大豆

三升半

郁李仁

一升碎

甘遂

三兩煮

右切以水一斗三升先煮猪腎桑根白皮澤漆葉大

豆取汁八升去滓內餘藥煎取二升七合分為三服

忌酢物

又方

甘遂

炒一兩半

赤茯苓

去皮

郁李仁

浸去皮尖研

黃芩



去黑

心

杏仁

去皮尖雙仁  
炒各二兩

澤漆葉

二兩

陳橘皮

浸去白  
焙二兩

澤瀉

微炒  
二兩

右搗篩每服五錢水三盞煎至一盞半去滓分溫二  
服一方用朴硝一方煎桑白皮湯調下末一錢以利  
為効

療氣忽發滿胸急者

桑白皮

四兩

橘皮

四兩

杏仁

三兩

甘遂

三兩

澤瀉

三兩

黃芩

四兩

赤小豆

一升

右切以水九升煮取二升半分三服忌酢物一方甘

草三兩

又方

青羊腎

具一

桑根白皮

兩四

茯苓

兩四

橘皮

兩三

李根白皮

兩四

黃耆

兩三

玄參

兩三

生薑

兩四

右切以水九升煮取二升七合分三服忌酢物

黃耆丸

出聖濟總錄

治水氣消腫定喘

黃耆

判

甘遂

炒

青橘皮

浸焙去白

麥蘖

大戟

炒

右為末煉蜜丸桐子大煎木通桑根白皮湯下

苦葶蘆丸

出聖濟  
總錄

治水氣喘小便赤澁腰腿浮腫不

得眠臥

右為末量人虛實施入黑牽牛半生熟各二兩為細末斟酌多少用每服二錢燈心湯調下食前

仙方萬安散 治男子婦人不論老幼一切沉深積塊

氣水蠱食蠱小腸膀胱豚疝氣偏墜木腎脚氣十隔

五噎翻胃吐食脾痛氣喘嗽痰飲咳嗽肺脹吐血咯  
血淋瀝者癥瘕癰腸風瀉血婦人赤白帶下經脉不  
調或後或前血崩中漏下惡積聚

黑牽牛

五兩生熟各半熟  
黃色不用焦黃

雷丸

三箇  
生用

大黃

二兩

生用

管仲

三兩

檳榔

三兩  
生用

右各為細末每服四錢重者五錢用沸湯浸至明調  
服畢細嚼生薑三片過藥一時刻取下病源各隨所  
傷如亂絲馬尾或如血蠱或如蛇蝦蟇之類各種樣

不齊此藥不動真氣四時着病皆可服之十歲者分作二服老幼衰弱臨時加減忌魚腥三五日

治男子婦人蠱氣及下元腿膝虛腫

猪苓 茯苓 漢防己 木通 陳皮

各等分

右為末每服四錢水一盞半用燈心十莖同煎至七分去滓溫服如服四服小便通為驗

權水丸 治男子婦人通身蠱脹不能動作

南康蛤粉

一兩

猪苓

半兩

澤瀉

半兩

真平胃散

一兩

右為末同平胃散蛤粉和勻用大蒜連皮灰火煨香  
熟搗爛和搜丸梧子大每服三十丸至五十丸用溫  
水送下日三服忌腥冷物濕麵

四炒丸

出危氏方

治氣血滯腹內蠱脹如鼓坐臥喘急不

安

枳殼

四兩去瓤切作兩指面大塊四處一兩用  
蒼朮炒去蒼朮一兩用蘿蔔子一兩同炒

黃去蘿蔔子

一兩用乾漆一兩炒黃去乾漆  
一兩用茴香一兩同炒去茴香止用枳殼為細末

右用羌花同炒蒼朮等四味同水二碗煎至一碗去

淬煮麵糊丸梧桐子大每服五十丸食後米飲下

中經丸

治蠱脹虛腫滿不思飲食

神麴

炒

乾薑

炮各一兩

麥蘖

炒一兩

吳茱萸

半兩湯洗

七次焙乾

右為細末麵糊為丸梧桐子大每服三十九丸溫酒送下食前日進三服

磁石丸

治蠱病少腹熱痛精液出白

右搗羅為末煉蜜丸梧子大每服三十九丸鹽湯下空

心臨臥各一服

苦蒿梨丸 治水蠱氣

苦蒿梨 木香 蘿蔔子

各等分

右為細末酒糊為丸梧子大每服三二十九空心溫酒送下

朱砂守病丸 專治久積一切蠱氣逐食證

人言

一兩

巴豆

去皮燒熱一兩

芫花

一兩醋炙

右為細末如皂子大每服三九空心一盞溫酒送下



治蠱脹

用皂角尖用香二兩重宣瀉五六次後

香綿散

生漆滓

一兩半

春蠶綿

三兩重

麝香

五錢

右以漆滓放在鉄鍋炒做灰綿用剪細入此鍋同漆滓炒作灰用碾末後將麝香入用飯飲湯調下好酒亦得

香木枳殼丸

治蠱脹

枳殼 芫花

各等分

右用醎醋浸芫花透將醋再煮枳殼爛搗芫花末丸  
桐子大每服數丸溫白湯送下

治蠱

用鷄尿醴酒調服之

消蠱湯

出直指方

治氣作蠱脹但腹滿而四肢頭面不腫

紫蘇莖葉

縮砂

肉豆蔻

生

枳殼

青皮

陳皮

三稜

蓬朮

檳榔

辣桂

白豆蔻仁

葶澄

茄木香

各一分

半夏

製

蘿蔔子

生各一分半

甘草

炙一分半

右剉每服三錢薑棗煎服

石燕子丸

治婦人男子氣蠱血蠱之疾

石燕子

四個煨

木通

大戟

海金沙

石韋

苦楝根

猪苓

海藻

扁竹

茴香

白牽牛

海蛤

瞿麥

通草

延胡

各半兩

右為細末燈心竹葉打麴糊為丸梧子大每服五十

九用燈心竹葉湯送下食前

奪命方丹 治氣蠱勞蠱血蠱筋蠱水蠱

麝香

半錢

大黃

生用五錢

黑牽牛

半兩

甘遂

二錢

澤瀉

半兩

香附子

半兩

右為細末每服一錢用白樟柳根汁半盞無灰酒半盞調藥末頃熱空心服之服藥後忌生人三日不可食魚腥鹽漿濕麪發氣等物六十歲以上十五歲以下只可服半貼大便取下惡物

香棗丸

出瑞竹堂方

治蠱氣滿病蠱有十種

用苦丁香為細末用熟棗肉為丸每服三十九煎棗湯送下空心服三服必愈

治蠱氣方

用環腸草不拘多少晒乾水煎利小便為度

五蠱丸

出聖濟總錄

治百病及諸色蠱

雄黃

椒目

炒

莽草

真珠

研

巴豆

去油盡

芫花

醋浸炒焦

鬼臼

礬石

燒令汁枯

藜蘆

去蘆頭微焙

獼肝

各一分

蜈蚣

一寸

附子

炮製去皮  
臍半兩

斑猫

去翅

足炒  
十枚

右為末煉蜜丸如小豆大斃合蜜收每食後服一九如未効增一九以利為度當有虫出形狀不可具載虫下後七日內切宜將攝凡人服此藥一劑虫出不損百病盡除勿食五辛又蛇毒甚者合五蠱丸未及且以大豆漬酒絞汁服半升差又酒服桔梗角末方寸匕日三服中毒甚不能服幹口開與之藥下心頭當

悶煩須臾即甦如此服七日後宜食豬脾臟補養今  
所錄蛇蠱方在卷末者緣蛇毒狀似水病治之且謂  
水藥不驗楊香所傳他仙徒都先生神方一十五首  
皆治之且謂水藥不驗蛇蠱次之餘方世人無有傳  
者楊磨云曾有親識患水病洪腫滿狀頃刻必死旦  
服此藥至暮獲安息不忍弃其滓以絹囊盛之凡煎  
防己湯須用白鰮於火中合之燒令通赤揩磨取淨  
免有油膩又於藥名二十味中各取一字合成四句

歌之庶使年久不忘胡牽犀麀海漢伐戟通桑青黃  
訶射白郁橘紫防榔

紫蘇煮散

出聖濟  
總錄

治水氣

紫蘇葉

防己

去皮

桑根白皮

切

白朮

劉碎各  
等分

右為散如茶法煎三兩沸齊熟即去白朮加甘草功  
如前方所說又有蛇毒蠱狀與水病相似四肢如故  
小便不堪澁但腹急腫而蠱脹不下食凡醫多悞作  
水氣治之宜細詳審當服太上五蠱丸



枳殼丸

出衛生寶鑑方

治久患五隔氣積噎塞氣血結滯腹

脹成蠱身瘦面黃肚急如鼓兼治脾積食蠱

厚朴

去皮一斤同大黃二兩生薑四兩棗五十枚川烏一兩以水煮棗爛為度只用厚朴

枳殼

麩炒去穰

右為末每服厚朴八錢枳殼二錢入定粉三錢膩粉二錢同碾令勻每服半錢熱米飲調下日進三服不計時候日三取服重者不過五日遂下惡物瘀血為應次以和脾胃藥補之

木香丸

出楊氏家藏方

治氣壅腹脹

方見本門水氣心腹鼓脹類五味木香丸

消脹丸

出楊氏家藏方

治蠱脹推氣退腫

法麴

四兩炒

乾薑

一兩

肉桂

去皮一兩

麝仁

三十粒去皮

巴豆

二十五粒去皮

木香

一兩

陳橘皮

去白一兩

檳榔

半兩

縮砂

一兩

黑牽牛

一小升用無灰酒半升浸一宿取出焙乾

右件為細末用獺猪肚一枚淨洗將前件牽牛盛在內用無灰酒五升慢火煮之酒盡肚爛取出於臼中搗極爛和前藥末一處杵為丸如棗豆大每服五十

九空心日午臨臥溫酒送下更量虛實加減之

蘿蔔子丸

出楊氏家藏方

治蠱氣脹滿四肢虛腫浮上氣喘

急小便秘澀

蘿蔔子

四兩炒令黃

雷丸

二兩炒黃

白附子

一兩半去黑皮

檳榔

半兩

陳橘皮

去白二兩

葛根

三兩炒黃

右件為末酒煮糊為丸如菉豆大每服十九至三十

九橘皮湯空心送下

又周益公陰德錄

治蠱腫秘方

永類鈴方

用膽礬水一鍾用信州蒲州明亮如翠璃似鴨嘴者  
用米醋煮製勝針鐵矣蓋膽礬亦銅之精液以其味  
辛酸補肝膽利脾胃皆佐以君臣之藥安魂魄消水  
腫此妙方也得者當如珍寶之故老嘗授以疎順飲  
即二十四味流氣飲加減嚥下沉香丸治水氣

縮砂飲

出朱氏  
集驗方

治氣脹氣蠱等病如神

蘿蔔子

自然汁浸縮砂炒乾或用  
蘿蔔汁浸數日炒乾亦可

右以縮砂為細末每服一大錢米飲調下

治蠱病

出本草

用薺花根搗末以飲服方寸匕立差

水蠱

附論

夫水蠱之狀膜脹皮膚黧黑搖動有聲此由脾腎氣虛濕氣淫溢久不瘥則害人如蠱之毒故謂之水蠱也

無比丸

出聖濟總錄

治水蠱通身腫滿

京三稜

煨判

牽牛子

膽礬

研

檳榔

判

芫花

醋浸炒各一兩

膩粉

一分

續隨子

硃砂

研

木香

各半

兩

珠粉

研三分

大棗

三十個湯內畧煮過  
去皮核取肉爛研

右除膽礬硃砂棗肉外同搗羅為細末用醞醋二大升先下硃砂膽礬棗肉於銀石器內煎五七沸次下諸藥末一處攪勻慢火候可丸如豌豆大每服十九丈夫溫酒下婦女醋湯下

檳榔丸

治蠱病

檳榔

郁李仁

各一兩

續隨子

甘遂

各半兩  
炒黃

蘭茹

樟柳根

黑牽牛

大黃

各一兩

木通

海金砂

各半  
兩

滑石

一  
兩

右為細末麵糊為丸梧子大每服三十九溫酒送下  
如瀉白粥補之常服只十九至十五丸忌鹽醋油醬  
油膩生冷麵粉忌半年

中隔丸

出聖濟  
總錄

治水蠱腹脹消腫滿痞氣

芫花

醋浸  
炒黃

甘遂

炒黃  
為末

大戟

炒各  
一兩

澤瀉

剉

青橘皮

湯浸  
去白

木香

各半  
兩

硃砂

研

乳香

研各  
一兩

巴豆

去皮膜出油  
研二十枚

右搗研為末煉蜜和丸如菉豆大每服三丸至五丸  
溫酒下

檳榔丸 治水蠱

檳榔

郁李仁

各一兩

樟柳根

黑牽牛

大黃

各一兩

木通

海金沙

各半兩

滑石

一兩

右為細末麵糊為丸梧子大每服三十九溫酒下如  
瀉白粥補之常服只喫十九至十五丸忌鹽醋油醬  
油膩生冷麵半年



瓠瓢煎方

出聖濟總錄

治水蠱徧體洪腫

用瓠瓢一枚以水二升煮一炊頃去滓煎堪九即九如小豆大每服米飲下十九取小便利利後作小豆羹食之勿飲水

楮枝煎方

治蠱病水腫

用楮枝剉半升以水五升煎至二升半去滓取汁入黑豆末半升煎成膏每服一匙空腹服之一方加細桑枝同煎

分氣散

出聖濟總錄

治水蠱腹腫利小便

甘遂

炒

商陸

剉炒

白牽牛

炒各半兩

檳榔

剉一枝

木香

一分

白丁香

研五十個

膩粉

研一錢

右搗研為散每服半錢匕溫酒調下實者加至一錢

匕

大黃湯

大黃

剉炒一兩半

麥門冬

去心焙三分

甘遂

微炒

茅根

剉

黃連

去鬚各一兩

貝母

炮去心三分

右粗搗篩每服二錢匕水一盞煎至七分去滓溫服

瞿麥湯

出聖濟總錄

治水腫腹脹滿急小便不通縱有而

黃赤

瞿麥穗

車前子

滑石

碎

茅根

剉

甘遂

微炒

苦參

右等分搗篩每服三錢匕以水二盞煎至七分去滓

溫服三日以利為度

海蛤丸

出聖濟總錄

治水蠱腹脹喘嗽似水氣

海蛤

燒灰  
半兩

滑石

研

凝水石

研各  
一兩

白丁香

研  
五

十五  
個

膩粉

粉霜

各一  
分

右一處杵勻麵粉糊和餅子以濕紙裹燒熟搗羅為末薄麵糊和丸如菴豆大溫酒下二十九

經驗白朮散 治水蠱氣蠱病

白朮

一兩

苦葶藶

一兩

川山甲

五錢

蛇退

一條  
全

黑牽牛

末二  
兩

土牛兒

一個燒土坑  
火內焙乾

右件為末每服三錢好酒調下

葶藶湯

出聖濟總錄

治水蠱身體洪腫喘滿

葶藶

帑上炒令黃紫色搗末一兩

右以水二盞入葶藶五錢匕大棗十枚擘破同煎至一盞去滓分為二服以利為度後服葶藶丸

葶藶丸

葶藶子

三兩炒令紫色

牽牛子

炒一兩半

海藻

洗去鹹炒一兩

澤漆

一兩

昆布

洗去鹹炒一兩

猪苓

去皮一兩

右搗羅為末煉蜜和丸小豆大每服米飲下十五丸再

稍加至二十九

治積年水蠱宜服此方

出聖惠方

大戟

半兩  
炒剉

甘遂

半兩

甜葶藶

半兩

巴豆

十四個  
炒熟去

皮尖  
油

赤小豆

四十  
五粒

右為細末以煑棗肉和九梧子大每服空心粥飲下

三九當日便利水為効

結水湯 治水蠱內腫即冷外腫即熱氣急無力

黃連

去  
鬚

大黃

剉碎炒  
各二兩

甘遂

微  
炒

葶藶

炒紫色  
各一兩

右搗篩每服二錢水盞半煎至七分去滓溫服日二

椒目丸

出聖濟總錄

治水蠱偏身洪腫

椒目

炒去汗

牡蠣

煨各二兩

葶藶

二兩

甘遂

二兩

右等分為末煉蜜和丸如小豆大每服米飲下十九取利二後服白米粥食之

治水蠱

木香

黑牽牛

炒

飛麵

炒黃色各四兩

白牽牛

炒四兩

右為細末用年深米煎湯和丸作成餅子約計如錢

大每服一餅子用陳皮湯送下食前日進二服忌魚雞麵等物

水銀丸 治大腹水蠱堅硬如石宜利小便方

水銀

一兩以黃芩肉研令星盡

川芒硝

一兩

甜葶藶

五兩炒紫

右件藥相和搗一千杵丸梧子大每服空腹服十九  
粥飲下差後食牛羊肉自補稍飲之

治腫腹重大動搖有水聲皮膚黑色名曰水蠱宜服此  
方



青蛙

二枚乾者  
塗酥微炙

螻蛄

七枚乾  
者炒

苦葫蘆

半兩  
炒

右為細末每日空心以溫酒調下二錢不過三服差

鼠尾草九

出肘  
後方

治水蠱亦治卒大腹水病

鼠尾草

馬鞭草

各五  
斤

右用水五斗煮取二斗去滓煎成膏為丸小豆大以  
輕粉為衣每服米飲下三九至六九禁肥肉生冷勿  
食

治腹大動搖作水聲皮膚麤黑似腫狀名為水蠱

出肘  
後方

白茅根

一大把切

小豆

三升赤者

右件以水二升煮取乾去茅根食豆水隨小便下

又方

出聖惠方

用鬼扇搗絞取汁服如雞子即下水更服取水盡如渴研麻子汁飲之為良

又方

出肘後方

治腹脹大動掣作水聲皮膚黑名水蠱

巴豆

九十粒去心皮炒黃

杏仁

九十個去皮尖炒令黃

右搗和服如小豆大一枚以水下為度勿飲酒佳忌

野猪肉蘆笋

又方

用茲彌草三十斤水三石煮取一石去滓更湯上煎  
令可丸服此如皂莢子三九至五六丸水隨小便去  
即飲糜粥養之

惡實丸

出聖濟  
總錄

治水蠱身體洪腫

用惡實微炒一兩為末麵糊和丸梧子大每服十九  
朱飲下勿嚼破

主腫腹動搖作水聲皮膚黑名曰水蠱

巴豆九十粒去心皮熬黃搗丸如小豆大小下一丸以利為度勿飲酒

治水蠱

出百一選方

用商陸根赤者杵爛貼臍心以絹繫縛定病自小水而出去商陸有二種白者不可用一方用生薑搗和取汁調五苓散取下惡水即愈

二聖散

一名二氣散

治水氣蠱脹滿

白牽牛

黑牽牛

各三兩

右為末用大麥麵四兩同一處為燒餅臨臥用茶一

盞下降氣為効

治水蠱腹脹

出百一選方

右取加味散四桂散細末等分和勻依法煎服紹興  
術士朱蓑衣名甫苦此疾醫者只令服加味散久之  
不効葛丞相授此法即安

治水蠱

出本草

用山豆根末酒下二錢

普濟方卷一百九十四

欽定四庫全書

普濟方卷一百九十五

明周王朱橚撰

黃疸門

總論

夫五疸者黃汗黃疸穀疸酒疸女勞疸是也黃汗之狀身體俱腫汗出而不渴狀如風水汗出染衣黃如藥汁其脉自沉此由脾胃有熱汗出入水浴水入汗孔中故汗黃也黃疸之狀食已即飢身體面目爪甲牙齒及小

便悉黃欲安卧或身體多赤多青皆見必發寒熱此由酒食過度臟腑熱急水穀相併積於脾胃復為風濕所搏結滯不散熱氣鬱蒸所為也大抵發於陰部其人必嘔發於陽部必振寒而發熱穀疸之狀食已即頭眩心中怫鬱不安而發黃此由大飢大食胃氣衝蒸所致也酒疸之狀身目皆黃心中煩痛足脛滿小便黃面發赤斑此由飲酒多進穀少胃内生熱因大醉當風水入所致也女疸之狀身目皆黃發熱惡寒小腹滿急小便不



利此由大勞大熱不能保攝房事復入水所致也其間多  
渴而腹脹者其病難療又有時氣傷風傷寒伏暑意令  
人發黃五疸口淡怔忡耳鳴脚弱微寒發熱小便白濁  
當作虛証治不可妄投涼劑愈傷血氣臨病之際不可  
不辨明也五疸雖不同其為黃則一自本自根未有非  
熱非濕而能致病者也濕氣勝則如薰黃而晦熱氣勝  
則如橘黃而明蓋脾主肌肉土色尚黃濕熱內蒸或重  
或輕不容掩於外矣自其濕熱瘀而傷血此又為血證

發黃何以明之疸証之黃小便不利血証之黃則小便  
自利耳況夫脾受濕熱鬱而不行意多有腹脹之候治  
法綱領大要疏導濕熱於大便小便之中人徒見茵陳  
湯五苓散黃連散三黃丸等隨試輒效則目之以尋常  
不思單陽無陰病勢已極疸而不渴猶可用攻疸而復  
渴其或腹膨全濟者鮮甚則寸口無脉鼻出冷氣與夫  
形如烟薰垂頭直視為心絕環口黧黑油汗發黃為脾  
絕此皆倉扁所望而驚焉者也脾與腎俱病為黑疸疸

脉大順弦急而堅逆已食而飢胃熱消穀也

黃疸 附論

論曰內經謂目黃者曰黃疸又曰安卧脉盛謂之黃疸  
其外証身體面目及爪甲小便盡黃其內証食已即飢  
此由酒食過度脾胃有熱復為風濕所搏瘀結不散熱  
氣鬱蒸故發是疾若面色微黃身體或青赤黑色皆見  
者與純熱之証不同當於濕家求之諸黃疸發於陰部  
其人必嘔發於陽部其人振寒而微熱疸而不渴者可

治其渴而疸者難治夫黃疸病發熱煩喘胸滿口燥者或因火劫其汗或從濕得熱在裏當下之

方

茯苓滲濕湯

出濟生  
拔粹方

治黃疸寒熱嘔吐而渴欲飲冷

身體面色黃小便不利不得安卧不思飲食

白茯苓

分五  
分五

梔子

分二  
分六

茵陳蒿

分三  
分三

澤瀉

分三  
分三

木猪苓

分三  
分三

生

黃芩

黃連

漢防己

白朮

蒼朮

陳皮

青皮

分各  
分二

右㕮咀作一服水煎空心服

知母湯

經濟總錄

治中熱黃疸寒熱往來脉數煩困四肢

勞倦

知母

焙

赤茯苓

去黑皮

常山

茵陳

犀

鎔

黃

連

去鬚

人參

羚羊角

鎔各一分

柴胡

鱉甲

醋炙去裙襖

甘

草

炙五錢

龍膽

半分

右為散別入丹砂末半分合研勻磁合收每服二錢

匕食前人參湯調下日再

黃連湯

聖經  
總錄

治黃疸遍身黃面目皆黃

黃連

去  
諸

大青

山梔子仁

柴胡

去  
苗

茵陳蒿

地

骨皮

黃芩

去黑  
心

芒硝

各一  
兩

大黃

二兩細  
剉醋炒

右粗搗篩每服五錢匕水一盞半煎八分去滓不拘

時服

茵陳湯

聖濟  
總錄

治黃疸目黃小便如血心煩躁悶口苦

頭痛

茵陳蒿

山梔子仁

各三  
分

木通

一兩

炙甘草

五  
分

栝蒌

根

柴胡

去苗各一兩

麥門冬

去心焙一兩五錢

右粗搗篩每服五錢匕水二盞入竹葉廿七片同煎至一盞去滓食後溫服

木通湯

治黃疸脾胃積熱皮肉皆黃煩躁口苦小便

赤澁

木通

剉瞿麥各一兩

赤茯苓

去黑皮

白茅根

大青

秦艽

去苗土各三分

生乾地黄

焙一兩五錢

右粗搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓食

前溫服

茵陳散

聖惠方

治黃疸食已即飢身體面目爪甲牙齒

小便悉黃或寒熱身體多赤多青皆由酒食過度為風濕所搏熱氣鬱蒸而成

茵陳 木通

梔子仁

各一兩

大黃

炒

桔萸

一兩

石膏

各二分 炙甘草

五分

右咬咀每服四錢水一盞生薑五片葱白一莖煎至八分去滓不拘時候溫服大小便秘加枳實赤茯苓



葶藶子又有傷寒瘀血不解鬱發於表為黃疸其脉浮緊當以汗解獨煎麻黃節飲之

木香丸 治諸般黃疸婦人血氣不和男子諸積皆治之

木香錢三皂礬分五藥煎分五蒸餅皮八箇去平胃散

紅棗肉分四針砂醋一兩炒

右為末用好醋和蒸餅紅棗肉入前藥為一處丸如梧桐子大每服十五丸姜湯送下日進二服

茵陳散

治黃疸心神煩躁小便赤大便難不得安卧

茵陳

一斤

犀角

五錢

升麻

一斤

梔子仁

三分

甘草

微赤

黃

芩

朴

硝

一斤

右為散

每服四錢

水一盞

煎六分

去滓

無時溫服

大

小便利為度

雞舌香湯

聖濟總錄

治黃疸面黃眼如金色四肢羸弱或

時煩渴

雞舌香

秦艽

去苗土

胡黃連

丁香

芎藭

各五

分柴胡去苗一兩

右為粗散每服三錢匕水一盞煎至六分去滓食前

溫服

山茵陳散

直指方

治黃疸大小便秘澀

梔子

一兩枳實

七枚

赤茯苓

葶藶

甘草

炙各一兩

每剉每服三錢薑三片煎服

治黃疸

草本

以亂髮燒灰水調服一錢匕日三服

又方

本草

以風延母煮服之

土瓜根散

聖惠方

治黃疸其小便自利白如泔色此狀

得之因酒過傷宜服

土瓜根

白石脂

桂心

栝蒌根

鬼絲子

酒浸

一日暴乾為末

牡蠣

燒為末各一兩

右為末每服煮大麥粥飲調下二錢日三四服

加減五苓湯

濟生方

治飲酒伏暑鬱發黃煩渴小便不

利

赤茯苓

去皮

猪苓

去皮

澤瀉

白朮

茵陳

各等分

方用

桂心

心

陳無菌

右㕮咀每服四錢水一盞半煎至八分去滓溫服不  
拘時候一方治黃疸利小便為散渴時水服方寸匕  
極飲水即利小便及汗出愈

一清飲

危氏方

治黃疸發熱諸熱通用

柴胡

三兩

赤茯苓

二兩

桑白皮

兩

製一

川芎

一兩

甘草

錢五

錢五

右剉碎每服三錢生薑棗子水一盞煎服

茵陳丸

聖惠  
總錄

治黃疸面目身體皆黃口乾煩躁發熱

狂悶

茵陳蒿

常山

各五錢

大黃

二分炒

朴硝

一分研

豉

一分炒

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九食後煎竹葉湯溫送下

必效散

直指方

治黃疸通用

葶藶子

隔紙炒

龍膽草

山梔子仁

山茵陳

黃

芩各等分

右為粗末每服三錢新水煎服

茵陳九聖濟總錄

治黃疸身面悉黃小便如濃梔子汁

茵陳二兩黃芩

枳殼一兩炒黃去白

大黃微炒升麻各一兩五錢

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十丸清粥飲

下日三四服

大黃硝石湯千金方

治黃疸腹滿小便不利面赤自汗

出為表和裡實當下之

大黃 黃蘗

硝石

各四兩

梔子

十五枚擘破

右㕮咀水煎去滓納硝石礬石煮一升頓服

茵陳湯 治黃疸小便赤

茵陳

山梔仁

秦朮

升麻

各四錢

右搗為末每服三錢水一盞煎服

柴胡湯

聖濟總錄

治黃疸通身並黃

柴胡

去苗茵陳

各一兩

升麻

龍膽

各三分

右剉碎每服五錢七水一盞半煎至八分去滓入地



黃汁一合攪令勻食後溫服

茵陳丸

聖濟總錄

治黃疸身體面目皆黃

茵陳

三分

大黃

剉炒

黃連

去鬚

黃芩

去黑心

各一兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服十五丸食後臨

卧溫水送下

黃連散

出濟生拔粹方

治黃疸身體面目皆黃小便秘澀臟

腑壅熱

黃連

去鬚剉醋炒

黃芩

去黑心

甘草

炙各一兩

右為散每服二錢匕食後溫水調下日三服治水腫不利小便非其法也故內經云濕氣在上以苦吐之濕氣在下以苦瀉之吐瀉後長服益元散加海金砂煎以長流水服之則愈矣大忌脚膝上針刺出水取一時之效後必死矣尤忌房室濕麵酒醋鹽味犯之必死

鐵刷湯 治黃疸面目遍身如金色

良薑

六兩  
油炒

茴香

二兩  
炒

甘草

八兩  
五錢

蒼朮

八兩

右為細末每服二錢重薑三片鹽少許水一盞煎至七分和滓空心服

四七湯 治黃疸

半夏錢五茯苓錢四紫蘇錢二厚朴錢三

右為粗末每服五錢水一盞生薑棗煎至七分去滓

無時服

治黃疸面目偏身如金色一名吹鼻散  
出聖惠方

瓜蒂十四箇母丁香一箇黍米四十粒

右先搗水蒂為末次入二味同為細末每用半字夜卧令病人先嚙水一口兩鼻內各吹半字吐了水便睡至夜或明日取下黃水旋用熟帛搵了直候取水定便服黃連散一方溫水調下頓服令盡吐利黃水兩服永除病輕者五日重者半月一方有赤小豆

梔子蘘皮湯

經驗良方

治黃疸頭微汗小便利而微發黃者

濕熱相搏微者宜服亦治瘟病發黃

黃蘘皮

二甘草

一山梔仁

十五箇

右為粗末每服五錢水一盞半煎至七分溫服不計

時候

梔子湯

聖濟  
總錄

治黃疸心中懊惱煩熱

山梔子仁

五錢  
枳殼

去白麩  
炒一分

大黃

一兩  
剉炒

右為粗末每服三錢匕水一盞入豉二十粒煎至七分去滓溫服不拘時金櫃方用枳實不用枳殼

豬苓散

肘後  
方

治黃疸病及狐惑病

豬苓

茯苓

白朮

各等  
分

右共為末每服方寸匕水調下

赤小豆散

肘後方

治黃疸心膈躁熱小便赤澀

赤小豆

一百粒

秫米

一百粒

雞糞白

一兩微炒

右為末每服以新汲水調下一錢日三四服黃汗當

出此通治面目黃即瘥

大黃丸

聖濟總錄

治黃疸面目飢瘦

大黃

劉一劬

芎藭

八兩

右為末用蜜和成劑甑上炊七遍丸如梧桐子大每

服三十丸熟水下空心食前日三服

治黃疸

草本

以麻草一把去節綿裹以美酒五升煮取半升去滓  
頓服如治傷熱表發亦宜汗之則愈如人行十里汗  
未出則再服冬月用酒春宜用水煮之良

治黃疸

草本

以芭蕉子生食之

消瘰黃

草本

以鳧茨作粉食之

秦椒散

千金方

治黃疸飲少溺多

秦椒

六銖五錢

右治下篩水服方寸匕日三

瓜丁散

本草

治黃疸目黃遍身如金色微腫五疸汗如

黃栢汁

瓜蒂

四十九箇六月六日採自然落者用如未用以煑榔葉裏於東牆有風處挂吹令乾

丁

香

四十九粒



右用乾鍋子燒烟盡為度細研作末小兒用半字吹  
鼻內及揩牙大人用一字吹鼻內立瘥一方為末如  
大豆許納鼻中令病人深吸取鼻中黃水出

梔子酒 治黃疸

梔子 茵陳

各一  
束

右以無灰酒二大碗煎至八分三更時分服之忌油  
膩濕麵豆腐生冷等物

柴胡湯

出直  
指方

柴胡

去苗五錢

甘草

炙一分

右剉以水一碗白茅根一握同煎至七分去滓溫服

葶藶丸

一名大黃九千金方

治黃疸大小便難喘急促

甜葶藶

炒二兩

大黃

炒一兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九溫米飲下食後臨卧服喘慢即藥止

治黃疸心膈燥熱小便赤澀

聖惠方

茅根

三把細剉

豬南

八兩細切

右以水三大盞煎茅根至二盞去滓入肉合作羹  
一服愈

茵陳五苓散

出濟生  
拔粹方

治黃疸

茵陳蒿末

錢一

五苓散

五分  
同煎

右和食前服方寸匕日三

治黃疸身眼黃如金色

危氏  
方

用東引桃根切細如筋若釵股者以下一握以水一  
大升煎取適溫空腹頓服後三日其黃離離如薄雲

散聚百日方平復可時飲一盞清酒飲之則眼中易散不飲則散遲忌食麪豬魚等肉採桃根之時不可使婦人雞犬見修製此是徐之才家秘方

治黃疸

經驗良方

用自死大螺燒灰存性平胃散各等分無灰酒煎茵陳湯調服不能飯煎湯調服

解熱方

直指方

治黃疸解諸熱淋

用生車前草研極細井水調下一方炒子為末米

飲調下立止洞瀉

治寒熱黃疸濕瘴

草本

取端午日南行猪苓合大丹是也

治黃疸百藥不瘥

草本

用驢頭一枚煮熟以薑蘘噉之并隨多少飲汁即效  
療男子女人黃疸病耳目悉黃飲食不消胃中脹熱生

黃衣在胃中此腸間有燥糞使病宜服

聖惠方

用煎煉猪脂五兩每服炒大半匙以葱白湯調服頻

頻服之以通利為度一方無蔥白止用豬脂溫熱服之燥尿下愈

治黃疸并利小腸作麤喫甚益顏色毒氣鬱蒸面目盡

黃寒熱發渴

聖惠方

用小麥苗杵絞汁飲六七合盡飲之三四日便愈大麥苗亦可服六七合日三四此酒疸也

治黃疸皮膚眼睛如金色小便赤

肘后方

用生蔓菁子末熟水下方寸匕日三先後十日愈

治患疸黃

聖惠方

用苜蓿根生搗絞汁服之良

治黃疸

肘后方

用柳枝以水一斗煮取濃汁半升服令盡

治大熱黃疸傷寒頭痛身熱癰瘡利小便

聖惠方

用茵陳細切煮羹食之亦宜又一方以茵陳為散水煎服

治黃疸熱毒結在胸膈上壅煩悶目赤口乾宜服之

聖惠

方

用藜蘆一兩炮令小變色搗為末每服以溫水調下五分以吐為效不過數服此秘方也

治黃疸

草本

用麗春草根搗取汁一盞空心頓服之服訖酒更即利三兩行其疾立已一劑不能全愈隔七日更一劑永瘥忌酒麵猪魚蒜粉酪等

治黃疸大渴煩悶

聖惠方



用苦瓠白瓤及子三兩炒令微黃搗為細末每服五分匕不拘時候以溫粥飲調下用瓠瓤有吐者則當詳之一方每服五分匕日一服十日愈

治黃疸面目盡黃昏重不能眠卧

聖惠方

用苦葫蘆瓤如彈子大以童子小便二合浸之三兩食頃取兩酸棗許分納兩鼻中病人深吸氣及黃水出良

治黃疸

聖惠方

用柞樹皮以三兩燒灰細研為末每服以新汲水調下日三服一方可服方寸匕

治黃疸小便不異欲自利腹滿而喘者不可除熱熱去

必噦

三因方一名  
小半夏湯

以半夏剉散每服用三錢以水二盞薑十片煎至七分不拘時服

治黃疸

本草

取鹽麩子乾搗為末食之

秦艽煮散

聖惠方

治黃疸身體面黃及目赤小便俱

黃心神煩悶

秦艽

去苗土三兩五錢

芒硝

一兩

右為末用牛乳二盞半煎至一盞半食前溫分二

服

治黃疸

千金方

大黃

二兩黃連

三兩黃蘗

一兩黃芩

一兩麥苗

五合

右五味為末蜜和丸如梧桐子大先食服三九日三

不知加至五九

茵陳湯

千金方

治黃疸身體面目盡黃

茵陳

黃連

各三兩

黃芩

二兩

大黃

甘草

人參

各一

兩

梔子仁

二十枚

右㕮咀以水一斗煮取三升分三服日三亦治酒疸

酒癖

治黃疸初得稍覺心中煩熱滿身黃色眼白睛黃覺如此者宜先合白鮮皮等七味湯以洩之黃連十味丸

以壓之

白鮮皮

兩三

乾葛

兩五

黃芩

兩三

鬱金豉

兩五

綿裹

梔子

十枚

芒硝

兩六

右以水八升煮至二升半去滓內芒硝分溫三服服相去如人行二十里久更服此湯當得利利後將息一二日則合後黃連等十味丸服之

黃連丸

黃連

兩五

黃芩

兩五

苦參

兩六

沙參

兩五

乾地黄

兩六

乾葛

兩六

梔子仁

三兩麥門冬

一升

茯苓

五兩地骨皮

五兩

右搗篩為末蜜和丸以米飲下初服十九日三服稍稍加至三十九大如梧子黃疸亦有單服豬脂得瘥者忌豬肉冷水大酢蕪荑等物

三物茵陳蒿湯

治黃疸身目皆黃皮膚麤塵出

茵陳蒿

一把石膏

一觔

千金方加大黃

二兩

右以水八升煮取二升半去滓以猛火燒石膏令正赤投湯中沸定取清汁適寒溫服一升自覆令汗出

周身偏以濕粉傅之則愈更一汗更一服一升汗出  
乃愈也

治黃疸面目爪甲皆黃心膈躁悶

千金方一  
名衣蒂散

衣蒂 秫米 赤小豆

各二十  
七枚

右治下篩病重者取如大豆二枚內著鼻孔中痛縮  
鼻洩更當出黃汗或從口中出汗升餘則愈病輕者  
如一豆不瘥間日復用又下里間以筒使人極吹鼻  
中無不死大慎之刪繁療天行毒熱通貫臟腑沉伏

骨髓之間或為黃疸黑疸赤疸白疸穀疸馬黃等病  
喘息煩更不絕一方治酒疸為細末每服半錢匕米  
飲調下以吐為度

增味導赤散

如宜方

治黃疸有熱小便赤澀面目黃

黃芩 車前子 山梔子 川芎 赤芍藥 生

地黃 木通

甘草

炙各等分

右咬咀竹葉薑煎加茵陳龍膽草

甘露飲子

旅舍脩要方

治胃熱卒黃疸遍身色黃腹滿小



便赤澁并治齒齦宣露口乾齒痛涎血臭氣飢而不  
欲食小兒瘡牽出而不快

石斛

生地黃

天門冬

去心

麥門冬

去心

枇杷葉

去心

黃芩

枳實

麩炒  
去穢

甘草

茵陳

去枝梗  
各一兩

熟地黃

右為散每服二錢水一盞煎至七分去滓溫服

三黃散

千金方

治黃疸面目身體盡黃

方見本門  
內黃類

治黃疸

草本

用秦艽一大兩細剉作兩貼子以上好酒一升每貼

半升酒絞取汁去滓空心分二服或利便止就中好  
酒人易治凡黃有數種傷酒曰酒黃夜食誤食鼠糞  
亦作黃因勞發黃多痰涕目有赤脉日益憔悴或面  
赤惡心者是崔元亮用之及治人皆得力極效秦虢  
須用新好羅文者

又方

肘後方

用黃雌雞一隻治之剉生地黃三觔內腹中急縛仰  
置銅器中蒸極熟絞取汁再服之

治黃疸草本

以臘雪小溫服之

治黃疸皮膚眼睛如金色小便赤草本

取小麥杵取汁一合

治諸黃疸草本

以樺木皮濃煮汁飲之良

針砂丸 治黃腫

針砂

八兩水淘淨醋浸三日炒成土色為度

平胃散

四兩

縮砂 香附

子

四兩

陳皮

青皮

各一兩

右為細末醋糊為丸如梧桐子大每服四五十丸飯

飲酒下

紫金丹

一名貼丸  
濟生拔粹方

治男子婦人患食勞氣勞遍身

黃腫欲變成水及久患瘰癧小腸膀胱面目悉黃

膽礬

三兩

黃蠟

一兩

青州棗

五十枚

右於磁合內用頭醋五升先下礬棗慢火熬半日取出棗去皮核次下蠟一處更煮半日如膏入好臘茶

末二兩同和丸如梧子大每服二三十丸茶酒任下  
如久患腸風痔漏陳米飲下日三昔趙彥才下血面  
如蠟不進飲食蓋酒病授此方服之終劑而血止面  
一月見效色鮮潤食亦倍常新安有一兵士亦如是  
與三百粒作十服亦愈

治黃腫

用皂礬同棗肉搗爛湯泡開蒸餅為丸如梧桐子大  
每服四五十丸茶湯任下

鐵砂丸

方 鮑氏

治黃腫

鐵砂

水淘淨晒乾醋炒碎八兩

蓬朮

三棱

醋煮

厚朴

陳皮

茱萸

泡各二兩

右為細末神麴醋煮作糊丸每服五十九丸米飲下忌

生冷油膩毒物

鮑氏又方

治證同前

鐵砂

一兩

黑牽牛

一兩

香附子

五兩

酒浸

右用鐵砂淘淨擦去銹盡入銚子入好醋炒赤紅指

熬可碎方可用又勿炒太過乃和二藥末醋糊為丸  
每服四五十九飲下

鮑氏又方

附子 乾薑 良薑 白芷 神麴 麥蘖 川

椒 茱萸 陳皮 青皮 三棱 蓬朮

右通前十五味各一兩治黃腫冷證

又方

鮑氏方

治冷氣通身腫獨腹腫四肢軟不行氣喘

黃腫者

良薑 乾薑

陳皮

各一兩

江子

四十九粒去殼袋盛四味同煮乾去江

子不用

附子

砂仁

草果

三稜

丁香 香附子 烏藥

澤瀉

檳榔

蓬朮

各一兩

鐵砂

醋炒碎二兩

右通共為末入陳倉米半升炒黃同研醋糊為丸生

薑湯下以上并鐵砂丸

治通身黃腫

神效方

瓜蒂

焙乾三四錢



右為細末每用半字於鼻內吹上日一度併吹三日  
如不愈後用黃芩末煎湯下五錢

諸黃 附論

論曰諸黃病者一身盡痛發熱面色潤黃七八日後壯  
熱口裏有血當下如豬肝狀其人小腹滿若其人眼睛  
澁痛鼻骨痛兩膊及項強腰背急即是患黃也黃病多  
大便澁但令小便快即不慮死不令大便多澁澁即心  
脹不安此由寒濕在表則熱蓄於肝胃腠理不開瘀熱

與宿穀相搏煩鬱不得消則大小便不通故身體面目皆變黃色凡黃病其寸口近掌無脉口鼻氣冷並不可治

方

白鮮皮散

聖濟總錄

治諸黃皮肉如金色小便赤黑口乾

煩渴

白鮮皮

二兩

黃連

去鬚土

瓜根

芍藥

大青

梔子

仁

茵陳蒿

枯蘘根

柴胡

去苗各一兩五錢

芒硝

三兩

五錢  
研

黃芩

去黑心  
一兩

真珠

三十枚  
燒赤

研大黃

三兩

右為散每服三錢匕煎茅根汁調下空心頓服取利  
至晚不利再服服了以小葱豉粥投之

無忌紫金丸

危氏方

治積黃理脾胃退黃

針砂

醋煮  
通紅

紫荊皮

浸酒

香附子

炒

三棱

醋浸一宿煮

蒼朮

來泔  
浸

青皮

去  
皮

陳皮

去  
白

厚朴

薑製

礞砂

各一兩

右為末醋糊和丸每服三十丸酒椒湯下熟水下亦

可

苦參方

千金方

治人無故忽熱振寒皮膚麤塵出小便

赤澁大便時秘氣力無異飲食不妨諸藥湯不除因

為久黃

苦參

黃連

瓜蒂

黃栢

去

皮大黃

蒸各

一分葶藶

炒

錢

右為末每服一大錢米飲調服當吐下隨時消息加

減一方用黃芩

茵陳蒿丸

聖濟總錄

治一切黃病

茵陳蒿

四兩

大黃

剉

黃芩

去黑心

梔子仁

各三兩

右生用為末煉蜜和丸如梧子大每服二十九米飲

下日二服量病與之小便金色身皮皆黃並治之

豬膏髮煎

聖惠方

治諸黃

豬膏

八兩

亂髮

如雞子大三塊

右和膏中煎之髮消藥成分再服病從小便出一方

不計時候溫水調下半雞子殼

治黃病多效

本草

用酸漿根搗汁飲之

治黃病身作金色

本草

用煮稻糠汁浸之一方服之又稻穀芒炒令黃細研作末酒服之

治五種黃病女子白沃漏下止血養精保血脉嗜食生

筋力去伏熱

本草

用芹菜作鹽菹及煮食之

治熱黃結實不通少頃當瀉一切惡物沙石草髮並出

不利小便

本草

用蔓菁子水和服

治黃病潤心肺

用生王瓜子

治發黃方

千金方

大黃 茵陳 黃蘗

梔子仁

各三兩

黃連

二兩

右㕮咀以水九升煮取三升分三服先服湯後服丸

又丸方

千金方

大黃

五兩

茵陳

梔子

各三兩

黃蘗

黃連

黃芩

各二兩

兩

右為末以蜜丸如梧子大白飲服二十丸令微利

茵陳丸

千金方

治氣淋臌脹腹大身體面目悉黃及酒

疸短氣不得息

茵陳

天門冬

梔子

各四兩

大黃

桂

各三兩

通草

石膏

各二兩

半夏

半升

右蒸大黃天門冬通草半夏梔子曝令乾合搗篩蜜



九如豆大服三九日三忌生魚以豆羹服不得用酒  
一方去石膏內滑石二兩不知加至十九

治發黃身面目悉黃如金色小便如濃藥汁衆醫不

能療者

千金方

茵陳 梔子

各四兩

黃芩

大黃

柴胡

升麻

各三

兩 龍膽

二兩

右咬咀以水八升煮取二升七合分三服若身體羸  
去大黃加梔子仁五六兩生地黃一升延生秘錄無

茵陳有梔子四兩栝蒌三兩芒硝二兩近效方有枳實二兩夫發黃色久變作桃皮色心下有堅嘔逆不下飲食小便極赤色少四肢逆冷脉深沉極微細遲者不宜服此方得下必變呢也宜與大茵陳湯除大黃與生地黃五兩服湯盡消息者脉小浮出形小見不甚沉微便可治也脉浮見者黃當明不復作桃皮色心小自寬也

大茵陳湯 治內實熱盛發黃如金色脉浮大滑實緊

數者夫發黃多是酒客勞熱或溫毒內熱者故黃如金色也

茵陳 黃蘗

各一兩五錢

大黃 黃芩

白朮

各一兩 甘

草 茯苓

括萎根

前胡

枳實

各二兩

梔子

枚

右㕮咀以水九升煮取三升分三服得快下消息三四日更治之

療黃心煩熱口乾皮肉皆黃

肘後方

秦艽

一錢二分

牛乳

一大升

右同煮七合去滓分溫服再服瘥

治一切發黃方

朱氏集驗方

山茵陳 川楝子 麥門冬 山梔子 甘草

右等分以燈心煎服不拘時候

破黃七神丹

華陀中藏經方

朴硝

二觔

硃砂

五兩

大黃

七兩

濕紙包煨

梔子

二兩

豉

半升

以絹袋盛

甘

遂

二兩

膩粉

一兩

右以水二斗熬令盡除甘遂豉梔子大黃只取朴硝  
硃砂粉末糊丸如彈子大每服一丸水下以吐瀉為  
度

棗礬丸 治食勞黃目黃身黃者

用皂礬不拘多少砂鍋內木炭燒通紅赤米醋內點  
之赤紅為細末棗肉為丸如梧子大每服二十三十  
丸食後生薑湯下

去目黃好睡

本草

用菴耳葉按安舌下令涎出

治患熱黃

草本

用扁蓄搗汁頓服一升重者再服

治熱黃及心痛

草本

以白蒿生搗汁飲之

治黃

草本

以髮髮燒灰水服一寸七日三

治五種黃病

草本

用翹搖生搗汁服一升日二瘥甚益人

黃汗附論

論曰黃汗者汗出如藥汁沾衣黃色故謂之黃汗由脾胃有濕瘀熱伏留熏發肌肉散而為汗其證使人身體虛浮骨節疼痛發熱汗出而不渴者是也

方

黃耆湯

聖惠方

治黃汗身體腫發熱不渴狀如風水汗

出染衣

黃耆

去蘆  
蜜炙

赤芍藥

茵陳蒿

各二兩

石膏

四兩  
淡豉一兩

麥門冬

去心  
一兩

炙甘草

五錢

右咬咀每服四錢水一盞生薑五片煎至七分去滓

食前服一方入竹葉十四片不用生薑一方無甘草

吳藍湯

聖濟方

治黃汗身體發黃汗出而不渴狀如風

水汗出着衣皆黃

吳藍

芍藥

麥門冬

去心

桑根白皮

剉

防己

白

鮮皮

山梔子

各一兩  
五錢



右剉如麻豆每服三錢匕水一盞煎至八分去滓空  
心溫服未效再服

茵陳蒿湯

聖惠方

治黃汗身體熱不退大小便不利

茵陳蒿

赤芍藥

炙甘草

剉

木通

剉

赤茯苓

去黑

皮

黃耆

各一兩

大黃

炒二兩

右剉如麻豆每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓  
溫服如人走十里再服以大小便通利為度

桂枝黃耆湯

治黃汗自出發熱身腫小便不利

白芍藥

一兩五錢

辣桂

一兩二錢

甘草

一兩

黃芩

五錢

黃耆

二兩

右劉散每服四錢水一盞半薑五片棗三枚煎服覆取微汗未汗再服

桂枝加黃耆湯

千金方

治黃汗病兩脛自冷假令發黃

此屬靡節食已則汗出又身常夜卧盜汗出者此勞氣也若汗出即發熱者久久身必甲錯也發熱不止者必生惡瘡也若身重汗出已輒輕者久久必身潤潤則胷中痛又從腰已上必汗出下無汗腰寬弛如

虫在皮中狀劇者不能食身疼重煩躁小便不利者  
名曰黃汗桂枝湯加黃耆五兩主之

桂

去粗皮

白芍藥

各三兩

甘草

炙三兩

黃耆

五兩

右剉如麻豆每服五錢匕水一盞半入生薑半分棗  
二枚擘破同煎取七分去滓溫服覆取微汗須臾不  
汗者食稀熱粥助湯力未汗再服直指方有黃芩名  
桂枝黃耆湯

甘草湯

聖惠方

治脾臟瘀熱不散心神煩亂小便赤澀

或汗出如藥汁

甘草

微炙

梔子仁

黃蘗

白朮

各一兩

右為散每服四錢以水一盞煎至六分去滓溫服日

四五服

黃耆苦酒方

千金方

治黃汗身體腫發熱汗出而不渴

狀如風水汗水沾衣色黃如藥汁脉自沉此由汗出入水中浴水入汗孔從外而得之

黃耆

五兩芍藥

桂

去皮各三兩

右剉如麻豆每服五錢匕苦酒一盞半煎至七分去  
滓溫服服之當心煩苦酒阻故也一方用苦酒三合  
水一盞半同煎

梔子丸

聖惠方

治黃汗體熱大小便不利

梔子仁

括萇

劉各一  
炒苦參兩

右為末醋漬雞子全用二枚丸如梧桐子每服三十

丸溫水下日四五服一方除熱不吐下即自消也

治黃汗汗出如藥汁沾衣身體虛浮

用蔓菁子二兩每服二錢匕井花水調下空心日三  
三服以知為度

急黃附論

論曰諸發熱心戰定必發為急黃謂其卒然發黃心滿  
氣喘命在頃刻故名急黃也有初得病即身體面目發  
黃者有初不知是黃死後變黃者但先辨其證當急治  
之此由脾胃有蓄熱穀氣鬱蒸因熱毒所加故有斯疾

方

龍膽湯

聖惠方

治急黃面目如金色渴欲飲水

龍膽一兩木通

到土瓜根

各一兩五錢

石膏

二兩碎

犀角屑

一兩梔子仁

五錢大黃

到炒一兩五錢

白茅根

到

朴硝

各一兩

右粗散每服三錢七用水一盞煎至七分食後溫服

白鮮皮散

聖惠方

治急黃頭目四肢煩熱疼痛小便赤

大便難心躁不得睡

白鮮皮 升麻

各五錢

朴硝

二兩

茵陳

一兩

黃芩 梔子

仁 大青

葛根

各五錢

大黃

炒二兩

右為散每服以新汲水調服三錢須臾當利三兩行如人行十里未利再服

茵陳湯

聖惠方

治急黃目如梔子色小便赤心煩悶

茵陳蒿

梔子仁

黃芩

去黑心

大黃

剉炒

白鮮皮

黃連

去鬚各一兩

朴硝

貝齒

煨各五錢

右除朴硝外粗搗篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去滓入朴硝末一錢再煎令沸食後溫服

犀角湯

治急黃熱毒攻發舌急眼黃



犀角屑

分三

茵陳蒿

梔子仁

升麻

各五錢

黃芩

去心

分三大黃

炒一兩

朴硝

研一兩五錢

甘草

五錢

右為散每服五錢水一盞半入竹葉四五片同煎至

一盞食後溫服

赤小豆散

聖惠方

治急黃煩熱口乾皮肉悉黃

赤小豆

合一

丁香

秫米

一

瓜蒂

薰陸香

另研各一分

青布

五寸燒灰研

麝香

另研一分

右各研散和勻每服一錢匕米飲調下食後服當吐

下黃水即瘥一方少許吹鼻中

犀解散 治急黃心膈煩躁目赤痛

犀角屑 黃芩 升麻 梔子仁 各一兩 茵陳 朴

硝 各二兩

右為散每服四錢以水一盞入竹葉三七片煎至六分去滓不拘時候溫服

升麻湯

聖濟總錄

治急黃面目如金色煩渴飲水

升麻

三分

秦艽

去苗土 一兩

凝水石

研一兩 五錢

括蔞根

三分

硝

三分

右粗散每服三錢匕用水一盞煎至七分去滓食後

溫服日三

丁香散

聖惠方

治急黃宜服吐之

丁香 瓜蒂

赤小豆

各七粒

右為散以雞子一枚相和用新汲水調服之當吐利  
即效未應再服

麥門冬飲子吐訖及灸了計即渴仍服

麥門冬

去心  
四兩

括蕒

三兩

竹葉

一升

茯苓

四兩

升麻

二兩

生蘆

根升甘草

炙一兩

右切以水七升煎取二升五合絞去滓分溫三服服後相去如人行八九里久服此飲渴即止

黑豆煎

治急黃心膈煩躁徧身悉黃

黑豆

一升生地黃

汁麥門冬

生藕汁

各二兩

酥

五錢

右先用水五盞煎黑豆至二盞去豆取汁再煎一盞然後下蜜生地黃麥門冬生藕等汁并酥相和慢火

煎成膏磁器盛候冷每服半匙或一匙食後含化日  
三服

瓜豆散 治急黃心上堅硬渴欲飲水氣息喘粗眼黃

瓜蒂

二合  
熬

赤小豆

二合  
為末  
煖漿水  
合

右服方寸匕一炊久當吐不吐再服五分匕若吹鼻  
中兩三黑豆許黃水出歇

芒硝散

十金  
方

治急黃熱氣骨蒸兩目赤腫

生地黃汁

八合

芒硝

一兩

大黃

一兩

錢

右每用二服五合日二以利為度不瀉二服熱甚方可用

大黃散 治急黃兼治氣痛黃

大黃

芒硝

各二兩

以水三升半清一宿平旦煎絞汁一升半納芒硝二兩絞服之瀉更當快利

雞子方

聖惠方

治急黃及心黃狂走煩躁不解

生雞子

二枚去黃用白

朴硝

五錢細研

右相和熟調頓服之效

治急黃小便赤黑口乾煩躁

聖惠方

用蔓菁子取油不計時候頓服如無油即以蔓菁子  
搗汁絞取一盞服之候顏色黃或精神憊用之有效  
未效再服

治暴熱身黃秘塞

用苦菜煮汁服之

治急黃欲死

本草

用雄雀屎兩枚細研調水溫服之

治五般急黃

本草

用山豆根末空心以水調下二錢

治心急黃

本草

用百合蒸過蜜和食之作粉尤佳紅花者名山丹不堪食

黃蒸湯

黃蒸

麥麴

猪屎

各一升



以水五升漬一宿煮取三升絞去滓頓服一升

治急黃

草本

取苦瓠一枚開口以水煮中攪取汁滴鼻中

治急黃黃疸及內黃腹結不通

草本

用蕪菁搗為末水絞汁服當得嚏鼻中出黃水及下

利

治卒患急黃熱盛欲死者

草本

於沙土中掘坎斜埋患人令頭出土上灌之久乃出

曾試有效當是土能收攝熱也

陰黃 附論

論曰陰黃者面色黃頭痛不發熱不欲聞人聲此由陽  
伏於陰邪熱沉潛散於肌肉身黃如橘故謂之陰黃昔  
人有說下之後謂身目發黃者當於寒濕中求之此其  
類也

方

茵陳散

治陰黃身體面目俱黃小便如豉汁色

茵陳 白鮮皮 黃芩 枯萋根 梔子仁 赤

芍藥

木香

各一兩

枳殼

一兩去白炒黃

柴胡

去苗黃連

朴

硝

土瓜根

茅根

大黃

炒各二兩

大青

一兩

右為散每服五錢水一大盞入豉五十粒煎至五分去滓溫服如人行十里再服以利一二行為度便煮稀蔥豉粥食之忌豬肉冷水魚蒜粘膩及熱食一方以茅根煮飲待冷空腹以茅根飲服一方有紫雪無

朴硝

秦艽丸

聖惠方

治陰黃身面悉黃大便澀小便如梔子

汁

秦艽

去苗

梔子仁

茵陳

檳榔

各一兩

商陸

分一

陳皮

湯浸去白

甜葶藶

隔紙炒令紫色各一兩

右為末煉蜜丸如梧子大每服二十丸溫水下日三

茵陳散

聖濟總錄

治陰黃身如橘色小便不利

茵陳

二兩

桂

去皮五錢

澤瀉

一兩

赤茯苓

去皮

白朮

猪苓

去皮

各三分

右為散每服二錢匕溫水調下日三服

大黃散

聖惠方

治陰黃小便不利面赤身汗出者表和

裏實也宜下之

大黃

炒

黃蘗

梔子仁

甘草

炙

木通

各一兩

朴硝

二兩

右為散每服四錢水一盞煎至六分溫服如人行十里再服以利為度

赤小豆散

聖惠方

治陰黃

赤小豆

丁香

各三  
七粒

麝香

一錢  
研

瓜蒂

二七  
枚

青布灰

二錢

右為散每服一錢匕熟水調下日二服以吐為度更

取少許吹鼻中即有黃水出為效

半夏湯

聖惠  
方

治陰黃小便色不變欲自利腹滿而喘

者宜服下

人參

去蘆  
頭

葛根

各二  
兩

半夏

一兩湯洗  
七次去滑焙

右剉如麻豆每服四錢匕水一盞生薑半分切煎取

七分去滓不拘時候溫服

秦朮湯

一名秦朮  
散聖惠方

治陰黃不欲聞人言小便不利

秦朮

去土  
一兩

旋覆花

赤茯苓

去

甘草

炙各  
五錢

右為粗末每服四錢匕以牛乳一盞煎至六分去滓

溫服不計時候

龍膽湯

聖惠  
總錄

治陰黃

龍膽

秦朮

去苗各一  
兩五錢

升麻

一兩

右為粗末每服五錢匕水一盞半浸藥一宿平旦煎

至八分入黃牛乳五合再煎至一盞去滓空心分溫服日二服再取利為度

治陰黃汗染衣涕唾黃

肘後方

用蔓菁子搗末平旦以井花水服一匙日加至兩匙以知為度每夜小便中浸少許帛子各書記日色漸退白則瘥不過服五升以來

治陰黃眼黃汗染衣涕唾黃

聖惠方

用大黃五兩飯下蒸一炊取出曝乾為散以溫水調



下日三四服常要大小便利為度

又方

用好黃蒸二大升每夜以水二大升浸微暖令熱勿令沸銅器中平旦絞取汁半升飲之餘汁湏飲則飲冬日微煖服夏日冷服每夜則浸依前服之亦得每夜小便中浸帛片取色退為驗忌麴猪羊魚等肉

療因將息傷熱變成陰黃通身壯熱小便黃赤眼如金色面又青黑心頭氣痛遠心如刺頭旋欲倒兼肋下

有瘕氣及黃疸等經用有驗本

草

用麗春草以春三月採花陰乾有前病者取花一升  
搗為散每平朝空腹取三方寸匕生麻油一盞頓服  
之日惟一服隔五日再進以知為度

治陰黃黃疸及暴急黃本

草

瓜蒂

丁香

各七枚

小豆

七粒

右為末黑豆許吹於鼻中少時黃水出瘥

內黃

附論

夫內黃者由熱毒之氣在於脾胃與穀氣相搏熱蒸於內不得宣散先心腹脹滿氣急然後身面悉黃名為內黃也

方

治內黃

梔子仁 黃芩 柴胡 升麻 括蔞根 大黃

炙芒硝 各一兩 龍膽 五錢

右為散每服四錢水一盞煎至六分去滓不拘時候

溫服

茵陳散

聖惠方

治內黃身面眼延黃如金色小便如濃

藥汁衆醫不能療

茵陳

二兩

黃芩

梔子

大黃

炒

龍膽

枳殼

去白炒黃

秦艽

去苗各一兩

升麻

三兩

右為散每服四錢水一盞煎至六分去滓不計時候

溫服

三黃散

一名三黃九聖惠方

治內黃身體皆黃宜服之

大黃

炒

黃連

去

黃芩

各二

兩

右為末每服以溫水調下二錢一方以蜜為丸不拘

時服

治內黃

用柳枝二兩剉水一盞半煎至六分不拘時候溫服

又方

用大黃一兩剉水一盞煎至六分不拘時候溫服

又方

用黃括蕒一枚大者以新汲水一盞半浸括蕒搗絞汁下蜜半合入三分細研攪令勻分三服頓服之

黃病小便下淋澁

附論

夫黃病小便下淋澁者由積熱在於心臟流於小腸則令小便澁少下物如沙而多疼痛也

方

木通散 治心臟黃結面目四肢通黃乾嘔大便不通小便赤色腹痛心煩

木通

一大黃 炒一兩 五錢

枳殼

黃芩

各五錢

赤芍藥

一兩

前胡

去蘆一兩 五錢

白朮

梔子仁

各三分

甘草

微炙 五錢

半夏

湯洗七次 去滑三分

右為散每服五錢水一盞生薑半分煎至五分去滓不拘時溫服以大小便利為度

茅根散 治心脾熱壅皮肉面目悉黃煩躁小便赤澀

茅根

麥門冬

去心各二兩

秦艽

去苗一兩

犀角

三分

大黃

一兩

五錢黃芩

一兩赤芍藥

三分朴硝

一兩

右為散每服四錢水一盞至六分溫服如人行十里再服以利為度

蘧麥散 治黃病小便赤澁心神煩悶

蘧麥

茵陳

黃芩

麥門冬

去心各一兩

大黃

一兩五錢

梔子仁

二兩

右為散每服四錢水一盞煎至六分無時服小便利為度

大黃散

治黃病腹脹滿小便赤而澁



大黃

炒

朴硝

梔子仁

各二兩

黃蘗

冬葵子

各一兩

右為散每服四錢水一盞煎至六分溫服日四五服

以利為度

茵陳散

治黃病心下橫堅小便赤黃不利疼痛

茵陳

木通

各一兩

赤茯苓

前胡

各三分

椒目

炒一分

赤芍藥

三分

右為末每服二錢以粥飲調下日四五服



普濟方卷一百九十五